

TEOREMA "ponte" tra limiti di successioni e di funzioni

Siano $f: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $l, x_0 \in \mathbb{R}^*$, x_0 pto di accum di X .

Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \text{ succ}^{\text{ne}} \{a_n\} \text{ a valori in } X \setminus \{x_0\} \\ \text{t.c. } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0 \text{ si ha } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = l.$$

Dim $\Rightarrow$

Sappiamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff$

$\forall V$ intorno di $l \exists U$ intorno di x_0 t.c.

$$\forall x \in U \cap X \setminus \{x_0\} \text{ si ha } f(x) \in V \quad (*)$$

Sia ora $a_n \in X \setminus \{x_0\}$ t.c. $a_n \rightarrow x_0$.

Fissato U intorno di x_0 (lo stesso di prima) si ha

$$\text{def}^{\text{te}} a_n \in U \cap X \setminus \{x_0\} \xRightarrow{(*)} \text{def}^{\text{te}} f(a_n) \in V$$

cioè $\forall V$ intorno di l $\text{def}^{\text{te}} f(a_n) \in V$ per $n \rightarrow +\infty$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = l.$$

$\square$

Dim $\Leftarrow$ Sappiamo che $\forall a_n \in X \setminus \{x_0\}$ t.c. $a_n \rightarrow x_0$
si ha $f(a_n) \rightarrow l$.

Dobbiamo provare che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Per assurdo supponiamo che ciò sia falso.

$\neg \left(\forall V \text{ intorno di } l \exists U \text{ intorno di } x_0 \text{ t.c. } f(x) \in V \forall x \in U \cap X \setminus \{x_0\} \right)$
↑ negazione

$\exists V \text{ intorno di } l \text{ t.c. } \rightarrow \left(\exists U \text{ intorno di } x_0 \text{ t.c. } f(x) \in V \forall x \in U \cap X \setminus \{x_0\} \right)$

$\exists V \text{ intorno di } l \text{ t.c. } \forall U \text{ intorno di } x_0$
 $\exists x \in U \cap X \setminus \{x_0\} \text{ verificante } f(x) \notin V$

Da questo momento V è fissato.

Prendiamo $x_0 \in \mathbb{R}$ per semplicità (fare il caso $x_0 = \pm \infty$ da soli).

Prendiamo $U_1 = (x_0 - 1, x_0 + 1)$

$\exists a_1 \in U_1 \cap X \setminus \{x_0\} \text{ t.c. } f(a_1) \notin V$

Sia ora $U_2 = (x_0 - \frac{1}{2}, x_0 + \frac{1}{2})$

$\exists a_2 \in U_2 \cap X \setminus \{x_0\} \text{ t.c. } f(a_2) \notin V$

⋮

al passo n -esimo prendo $U_n = (x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$

$\exists a_n \in U_n \cap X \setminus \{x_0\} \text{ t.c. } f(a_n) \notin V$

In questo modo costruiamo una successione

$a_n \in X \setminus \{x_0\}, a_n \in U_n \Rightarrow |a_n - x_0| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$

$\Rightarrow a_n \rightarrow x_0 \xRightarrow{\text{dall'ipotesi}} f(a_n) \rightarrow l$

Questo è assurdo perché $f(a_n) \notin V$ intorno di l .



□

Limiti di funzioni elementari.

Potenze

$$f(x) = x^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad (x > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

Dim sia $a_n \rightarrow +\infty \Rightarrow (a_n^\alpha) \rightarrow \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$

già provato per le succi


$\Rightarrow$ teor. ponte $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} \text{i dem} \end{cases}$

□

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^\alpha = x_0^\alpha \quad x_0 \in (0, +\infty)$$

Limiti di esponenziali $f(x) = b^x$
($b > 0$)



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} b^x = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1 \\ 1 & \text{se } b = 1 \\ 0 & \text{se } 0 < b < 1 \end{cases}$$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} b^x = \begin{cases} 0 & \text{se } b > 1 \\ 1 & \text{se } b = 1 \\ +\infty & \text{se } 0 < b < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} b^x = b^{x_0} \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$$

Logaritmi

$$y = \log_b x$$

$$(x \in (0, +\infty)) \\ b > 0, b \neq 1$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_b x = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1 \\ -\infty & \text{se } 0 < b < 1 \end{cases}$$


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_b x = \begin{cases} -\infty & \text{se } b > 1 \\ +\infty & \text{se } 0 < b < 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \log_b x = \log_b x_0 \quad \forall x_0 \in (0, +\infty) \\ \forall b > 0, b \neq 1$$

Per le potenze x^α , per alcuni esponenti razionali i limiti si possono estendere anche a $x < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{4/5} = +\infty$$

$$\text{"} \quad \sqrt[5]{x^4}$$




$$\lim_{x \rightarrow -3} x^{4/5} = (-3)^{4/5} = 3^{4/5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{-3/5} = 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^{-3/5} = -\infty$$

$$x^{-3/5} = \frac{1}{x^{3/5}}$$



Limiti di funzioni trigonometriche:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sin x \quad \nexists \quad (\text{già visto})$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \cos x \quad \nexists$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 \quad (\text{già visto})$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0 \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$$

Dim $0 \leq |\sin x - \sin x_0| =$

Formule di prostaferesi: $\sin x - \sin x_0 = 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2}$

$$= 2 \left| \sin \left(\frac{x-x_0}{2} \right) \right| \left| \cos \left(\frac{x+x_0}{2} \right) \right| \leq \cancel{2} \frac{|x-x_0|}{\cancel{2}} \rightarrow 0$$

$|\sin t| \leq |t| \quad \forall t$

$$\frac{1}{2} \frac{|x-x_0|}{2} \quad \frac{1}{1}$$


$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0 \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \lim_{x \rightarrow x_0} \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(x_0 + \frac{\pi}{2} \right) = \cos x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{tg} x$$

"

$$\frac{\sin x}{\cos x}$$



$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{tg} x \nexists$ con il teorema ponte.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin x_0}{\cos x_0} = \operatorname{tg} x_0. \quad x_0 \neq (2k+1)\frac{\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sin x}{\cos x} = +\infty$$

$\swarrow$ 1
 $\downarrow$ 0⁺

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \operatorname{tg} x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 2x^3 \sin x}}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sqrt{1 + 2x \sin x}}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \nexists$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2 + 2x^3 \sin x}}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \text{ " " } = -1$$


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{\frac{1}{x} \rightarrow 0} e^y = 1$$

$\frac{1}{x} = y \rightarrow 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} e^{1/x} \nexists$ perché (vediamo) è diverso per $x \rightarrow 0^+$
 $x \rightarrow 0^-$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = \lim_{\substack{y \rightarrow +\infty \\ y = \frac{1}{x}}} e^y = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = \lim_{\substack{y \rightarrow -\infty \\ y = \frac{1}{x}}} e^y = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lg \left(\frac{\pi x^4 - 3x}{x^3 \log(1 + e^{2x})} \right) = +\infty$$

$$\frac{\pi x^4 - 3x}{x^3 \log(1 + e^{2x})} = \frac{+\infty}{+\infty} \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad \text{devo capire se } e^{\frac{\pi}{2} +} \text{ o } \frac{\pi}{2}^-$$

$$\log(1 + e^{2x}) = \log(e^{2x} (1 + o(1))) = \underbrace{\log(e^{2x})}_{2x} + \underbrace{\log(1 + o(1))}_{o(1)} =$$

$$= 2x (1 + o(1)) \sim 2x$$

$$\frac{\pi x^4 - 3x}{x^3 \log(1 + e^{2x})} < \frac{\pi x^4}{2x^4} = \frac{\pi}{2}$$

$\checkmark$
 $x^3 \log(e^{2x}) = 2x^4$

quindi

$$\frac{\pi x^4 - 3x}{x^3 \log(1 + e^{2x})} \rightarrow \left(\frac{\pi}{2} \right)^-$$

CONFRONTO TRA INFINITI.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} = 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{dove } b > 1$$

il limite è banale per $\alpha \leq 0$: viene 0

Dim teor ponte: se $du \rightarrow +\infty$, allora $\frac{(du)^\alpha}{b^{du}} \rightarrow 0$ (fatto!)

e quindi: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} = 0$ □

Diremo che $\left\{ \begin{array}{l} b^x \text{ è un infinito di ordine superiore} \\ \text{(per } x \rightarrow +\infty) \end{array} \right\}$ rispetto a $x^\alpha \quad \forall \alpha > 0$ $x^\alpha = o(b^x)$
per $x \rightarrow +\infty$

DEF Date due funzioni $f(x), g(x)$ t.c. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$, diremo che

$f(x)$ è un infinito di ordine superiore risp. a $g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0, \text{ ossia } \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = +\infty$$

$(g(x) = o(f(x)) \text{ per } x \rightarrow x_0)$

Esempio Per $x \rightarrow -\infty$, x^3 è infinito di ordine superiore risp. a x^2 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{color: red} \quad (x^2 = o(x^3) \text{ per } x \rightarrow -\infty)$$

Per $x \rightarrow 0^+$, $\frac{1}{x^3}$ è un infinito di ordine superiore risp. a $\frac{1}{x^2}$

$$\frac{(1/x^3)}{(1/x^2)} = \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$$

$\left(\frac{1}{x^2} = o\left(\frac{1}{x^3}\right) \text{ per } x \rightarrow 0^+ \right)$

Conseguenza: se $x \rightarrow 0^+$

$$\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} \sim \frac{1}{x^3}$$

||

$$\frac{1}{x^3} \left(1 + \underset{\substack{\downarrow \\ 0}}{x} \right) \sim \frac{1}{x^3}$$

DEF Siano $f(x), g(x)$ def^{te} $\neq 0$ per $x \rightarrow x_0 \in \mathbb{R}^*$

Scriviamo che $g(x) = o(f(x))$ per $x \rightarrow x_0$

$$\text{se } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0, \text{ cioè } \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = +\infty$$

Quindi $g(x) = o(1)$ per $x \rightarrow x_0$ significa $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

$$x^2 = o(x^3) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty$$

$$\text{ma } x^3 = o(x^2) \quad x \rightarrow 0$$

$$\frac{x^3}{x^2} = x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow 0$$

Conseguenza:

$$\text{se } x \rightarrow +\infty$$

$$x \rightarrow 0$$

$$x^2 + x^3 \sim x^3$$

$$x^2 + x^3 \sim x^2$$

$$x^2 \left(1 + \underset{\substack{\downarrow \\ 0}}{x} \right) \sim$$

Questo si generalizza così:

Se $g(x) = o(f(x))$ per $x \rightarrow x_0$, allora

$$g(x) + f(x) \sim f(x) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{b^x}_{\downarrow 0} \cdot \underbrace{|x|^\alpha}_{\downarrow +\infty} &= \lim_{\substack{t \rightarrow +\infty \\ t = -x \rightarrow +\infty}} b^{-t} t^\alpha = \quad \forall b > 1 \\ &\quad \forall \alpha > 0 \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^\alpha}{b^t} = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} b^x |x|^\alpha = 0 \quad \forall b > 1 \quad \forall \alpha > 0$$