


Due lezioni fa avevamo risolto la diseg^{ne}

$$\cancel{1} < \left(\frac{1}{9}\right)^{2x-3} < \cancel{27}$$

$\frac{1}{2}$ 28

$$\frac{1}{2} < \left(\frac{1}{9}\right)^{2x-3} < 28 \quad (*)$$

Si applica alle due disuguaglianze la funzione $\log_{1/9} x$



(*) equivale a

$$\log_{1/9} 28 < 2x-3 < \log_{1/9} \frac{1}{2}$$

$$\frac{\log_{1/9} 28 + 3}{2} < x < \frac{\log_{1/9} \frac{1}{2} + 3}{2}$$


oss $\log_{1/9} \frac{1}{2} = -\log_{1/9} 2 = -\frac{\log 2}{\log \frac{1}{9}} = \frac{\log 2}{2 \log 3}$

$\log \frac{1}{9}$
" $-2 \log 3$

$$\log_{1/9} 28 = \dots$$


Disegnare il grafico di $f(x) = 2^{x^2+x}$
e discuterne l'invertibilità.

$$y = x^2 + x$$



$$y = 2^{x^2+x}$$

$y = 2^t$ strettamente crescente e positivo



La funzione ha un grafico apparentemente simmetrico
rispetto alla retta verticale $x = -\frac{1}{2}$

Come si verifica?

la sua traslata $g(x) = f(x - \frac{1}{2})$ è pari?

$$\begin{aligned} g(x) &= f\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2^{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + x - \frac{1}{2}} = \\ &= 2^{x^2 - x + \frac{1}{4} + x - \frac{1}{2}} = 2^{x^2 - \frac{1}{4}} \end{aligned}$$

è pari?
sì perché dipende da x^2 .

In alternativa (vedi grafico) vedo se $f(x^*) = f(x)$

x^* è il simmetrico di x rispetto a $x_0 = -\frac{1}{2}$

$$\frac{x^* + x}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow x^* = -x - 1$$

$$f(-x-1) \stackrel{?}{=} f(x)$$

$$2^{(-x-1)^2 - x - 1} \stackrel{?}{=} 2^{x^2 + x}$$

$$\cancel{x^2 + 2x + 1 - x - 1} = \cancel{x^2 + x}$$

$$f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto 2^{x^2 + x}$$

è suriettiva? No, ma lo diventa se sostituisco l'insieme di arrivo con $[2^{-1/4}, +\infty)$.

è iniettiva? No, ma lo diventa restringendo il dominio a $\underbrace{[-\frac{1}{2}, +\infty)}$ oppure $(-\infty, -\frac{1}{2}]$
scegliamo questo.

$$f(x) = 2^{x^2 + x} : [-\frac{1}{2}, +\infty) \longrightarrow [2^{-1/4}, +\infty)$$

è suriettiva? sì perché è continua in un intervallo
 $\Rightarrow$ ammette tutti i valori tra
 $\min f = 2^{-1/4}$ e $\sup f = +\infty$

Resta definita la funzione inversa

$$f^{-1}: \underset{y}{\left[2^{-1/4}, +\infty \right)} \longrightarrow \left[-\frac{1}{2}, +\infty \right) \quad \Downarrow$$

$\mapsto f^{-1}(y) = \text{l'unico } x \text{ t.c.}$
 $f(x) = y$

$$2^{x^2+x} = y$$

$$x^2+x = \log_2 y$$

$$x^2+x - \log_2 y = 0$$

Risolvo in x

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \log_2 y}}{2}$$

oss

$$1 + 4 \log_2 y \geq 0$$

$$\log_2 y \geq -\frac{1}{4}$$

$$y \geq 2^{-1/4}$$

vero

scelgo il "+" perché
 $x \geq -\frac{1}{2}$

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + 4 \log_2 y} \right)$$