ANATOMIA PATOLOGICA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE I

Manila Antonelli

English

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Catalogo dei Corsi di studio

Benvenuto **manila.antonelli@uniroma1.it** | logout



MANILA ANTONELLI

Bacheca | Ricevimento | Curriculum docente | Ultime pubblicazioni IRIS | Insegnamenti

Moodle docente

TLB Neuromed ISTITUZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA
TLB Neuromed CITOPATOLOGIA
TLB Neuromed TECNICHE E STRUMENTAZIONI DI BASE NEL LABORATORIO
TLB Neuromed DIAGNOSTICA MOLECOLARE SU TESSUTO
Medicina e Odontoiatria CCLB ANATOMIA PATOLOGICA

Dipartimento

SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE

SSD


MED/08


PATOLOGIA POLMONARE
non neoplastica

LESSON PLAN
Macroscopica del polmone
Microscopica del polmone
Edema polmonare
Embolia polmonare
Infarto polmonare
Polmonite tipiche
Polmonite atipica

GABBIA TORACICA

All'interno della cavità toracica





12 coste-ostrocartilagine


Flessibilità

1-7


8-10 (arco costale)

11-12

SPAZIO PLEURICO



Liquido pleurico
quantità 10-20ml





Colore: 70% dei casi giallo citrino

Emorragico: se Ht > 50% parla di emotorace (traumi toracici, versamenti neoplastici con varie sfumature). L.P. emorragico o siero-emorragico si può trovare nell'embolia polmonare, nell'infarto polmonare, nella tubercolosi e nei tumori

Tab. 1 Cause più frequenti di versamento pleurico (da Light modificato)[1].

Trasudati	Essudati
Scompenso cardiaco congestizio	Cancro
Cirrosi	Polmonite
Sindrome nefrosica	Trauma
Embolia polmonare	Tubercolosi
	Embolia polmonare
	Artrite reumatoide
	LES

Versamenti di tipo trasudatizio sono dovuti a alterazioni dell'equilibrio tra pressione idrostatica e pressione oncotica

Versamenti di tipo essudatizio sono dovuti a fattori lesivi locali che alterano la permeabilità capillare

Tab. 2 Test indicati in base alle caratteristiche macroscopiche del liquido pleurico (da Light modificato)[1].

Apparenza	Test indicato	Interpretazione dei risultati
Ematico	Ematocrito	< 1% dell'Ht periferico → non significativo 1-2 % → cancro, embolia polmonare, trauma > 50% → emotorace
Torbido, opaco*	Centrifugazione	Sovranatante torbido → lipidi elevati
Sovranatante torbido	Trigliceridi	> 110 mg/dl → chilotorace 50-110 mg/dl → analisi delle lipoproteine: se chilomicroni → chilotorace ≤ 50 mg/dl e colesterolo > 250 mg/dl → pseudochilotorace
Odore putrido	Colorazione, colture	Infezione da anaerobi

*Quest'aspetto può significare presenza di cellule, detriti o lipidi.

Il dosaggio di proteine ed LDH nel siero e nel versamento pleurico consente di distinguere essudato da trasudato

Tab. 3 Sensibilità per formulare la diagnosi di essudato (da Light, modificata)[1].

TEST	sensibilità (%)	specificità (%)
Criteri di Light (uno o più dei seguenti tre)	***98***	***83***
• concentrazione proteine totali del liquido pleurico/proteine sieriche > 0,5	86	84
• concentrazione LDH del liquido pleurico/LDH sierico > 0,6	90	82
• LDH del liquido pleurico (valore assoluto) > 200 UI o > 2/3 rispetto al limite superiore del range di riferimento per LDH nel siero	82	89

Liquido pleurico di nuova insorgenza o di eziologia sconosciuta, che alla TC, all'RX in decubito laterale o all'ecografia appaia di spessore ≥ 10 mm.




Fig. 1 Algoritmo di riferimento per la valutazione del paziente con versamento pleurico[1].







FIGURA 24-1
Organi dell'apparato respiratorio.



Bronco destro ha diametro > del sinistro e un decorso più verticale (maggiore facilità di depositare corpi estranei)
Prima di entrare nel polmone emette il bronco lobare superiore e dopo emette i bronchi lobari inferiore e medio

Bronco sinistro ha un decorso più orizzontale e si ramifiica dopo essere entrato nel polmone


Consistenza spugnosa Colore roseo-grigio



Polmone sinistro

Scissure obliqua

Nota falsa scissura (variante anatomica benigna)
Invaginazione della pleura viscerale non è una vera scissura.



Polmone destro


Scissure obliqua

Scissura orizzontale

Disposizione arteria polmonare bronchi

Polmone destro
Regola DD

Posizione arteria polmonare rispetto alla diramazione del bronco principale




Disposizione arteria polmonare bronchi


Polmone sinistro
Regola SS





Posizione arteria polmonare rispetto
alla diramazione del bronco principale




ALBERO BRONCHIALE







Bronco destro ha diametro > del sinistro e un decorso più verticale (maggiore facilità di depositare corpi estranei)
Bronco sinistro ha un decorso più orizzontale



DIFFERENZA TRA BRONCHI E BRONCHIOLI


1. Bronchioli si ramificano in 5-7 bronchioli terminali e poi in 4-8 generazioni di bronchioli respiratori

2. Bronchioli si differenziano dai bronchi per l'assenza di cartilagine e ghiandole sottomucose

3. Bronchioli hanno una mucosa rivestita da un epitelio diverso da quello dei bronchi.

ALBERO BRONCHIALE- Modificazioni
Struttura microscopica

MODIFICAZIONI STRUTTURA MICROSCOPICA:
-diminuzione della quantità di cartilagine (anelli, placche, fino a scomparire- 1mm)



Cartilagine assente a partire dai bronchioli

STRUTTURA DELLE VIE AEREE

▪In quanto organi cavi, le vie aeree risultano costituite dalle quattro tonache:

- Tonaca mucosa + *muscularis mucosae*
- Tonaca sottomucosa
- Tonaca muscolare
- Tonaca avventizia

▪ Esistono in realtà due tipologie di tonaca mucosa che rivestono la porzione di conduzione dell'apparato respiratorio:


-Mucosa respiratoria
-Mucosa olfattiva

MUCOSA RESPIRATORIA


Riveste l'intera via respiratoria **ad eccezione** della regione olfattoria, l'orofaringe e corde vocali (pavimentoso pluristratificato), bronchioli terminali e respiratori (epitelio cubico non cigliato), alveoli (epitelio pavimentoso semplice)


E' costituito da un epitelio pseudo pluristratificato ciliato, dotato di ciglia mobili e numerose cellule mucipare caliciformi, la forma più semplice di ghiandola esocrina perché unicellulare secernente muco.

Intrappola ed eliminare pulviscolo, pollini e batteri inalati con l'inspirazione grazie e all'azione delle ciglia che spingono il muco verso la faringe dove vengono deglutite e digerite piuttosto che contaminare i polmoni (scala mobile mucociliare).



EPITELIO RESPIRATORIO
Cilindrico ciliato pseudostratificato






La tonaca mucosa è di tipo respiratorio, ma nei bronchioli respiratori l'epitelio diventa cubico non cigliato.


Modificazioni progressive delle diramazioni bronchiali verso quelle terminali

- Lo spessore della mucosa tende a diminuire (scompaiono ghiandole e cellule caliciformi)
- Progressivamente scompaiono le ciglia dell'epitelio

Modificazioni progressive dell'epitelio e NON SOLO !!


1. Diminuzione dell'altezza delle cellule epiteliali:
Da epitelio cilindrico pseudostratificato a epitelio piatto (alveoli polmonari)





2. Aumenta lo spessore della tonaca muscolare (muscolo liscio) per il controllo del diametro bronchiolare, andamento elicoidale per evitare strozzamento del bronchiolo durante la contrazione.


3. Aumenta il del tessuto elastico rispetto allo spessore della parete fondamentale nelle modificazioni di volume del polmone in particolare nell'espirazione



-Aumenta lo spessore della tonaca muscolare **muscolo liscio** e (controlla il diametro bronchiolare, andamento elicoidale per evitare strozzamento del bronchiolo durante la contrazione) e **tessuto elastico** rispetto allo spessore della parete (fondamentale nelle modificazioni di volume del polmone in generale e in particolare nell'espirazione)

BRONCHIOLI terminali

- Diametro da <1 a 0,2 mm; riforniscono d'aria un **lobulo polmonare**
- Parete senza cartilagine
- Assenza di ghiandole
- **Strato continuo di muscolatura liscia** (si contrae alla fine dell'espirazione –)



LEGENDA:


C = Capillare polmonare

V = Vaso

T = Bronchiolo terminale


R = Bronchiolo respiratorio


A = Alveolo



PORZIONE RESPIRATORIA: BRONCHIOLI RESPIRATORI --> ALVEOLI

La biforcazione dei bronchioli TERMINALI dà origine ai bronchioli RESPIRATORI





BRONCHIOLI RESPIRATORI

- **Presentano lungo il loro decorso estroflessioni di forma emisferica: gli ALVEOLI (SCAMBI RESPIRATORI)**
- **ALVEOLI: estroflessioni sacciformi circondate da una rete di capillari originati da rami dell'arteria polmonare (e anche da fibre elastiche)**
- **Sono connessi ai singoli alveoli ed a multipli alveoli attraverso regioni detti**

DOTTI ALVEOLARI (parete completamente estroflessa in alveoli)

↓


SACCHI ALVEOLARI

(camere connesse a più alveoli)

FIBRE ELASTICHE: Mantenere la posizione degli alveoli e bronchioli e il ritorno alle normali dimensioni dopo l' espirazione

- **ogni Polmone ha circa 150 milioni di alveoli: aspetto spugnoso**
- **Fibre elastiche (apertura durante l'inalazione, consente la distensione, inalazione spontanea)**

ALVEOLI: D= 200 μm



300 milioni di alveoli nei polmoni; area totale di scambio 140 mq

PARETE DELL'ALVEOLO


1. **Epitelio alveolare PAVIMENTOSO SEMPLICE monostrato di cellule PNEUMOCITI (tipo I e II)**
2. **Strato Connettivo vascolare (rete di capillari accolta in uno stroma di fibre collagene ed elastiche)**

- **PNEUMOCITI di TIPO I estremamente sottili.**
- **Coinvolti negli SCAMBI GASSOSI.**


- **PNEUMOCITI di TIPO II. Contengono i CORPI LAMELLARI contenenti il SURFATTANTE, che abbassa la Tensione Superficiale degli alveoli impedendone il collassamento**

EDEMA POLMONARE

Accumulo di liquido in eccesso nel tessuto interstiziale e negli alveoli
(altera lo scambio di ossigeno tra l'aria e il sangue)



Assenza di liquido negli alveoli




Presenza di liquido negli alveoli

EDEMA POLMONARE


Accumulo di liquido nel tessuto interstiziale e negli alveoli polmonari.

- Edema polmonare emodinamico
  - (alterazione emodinamica)
- Edema polmonare da lesione della membrana alveolo-capillare
  - (incremento della permeabilità)

1. Edema polmonare emodinamico



- Aumento della pressione idrostatica nei capillari
  Il liquido è spinto fuori dalla parete del vaso
- Accumulo interstiziale ed edema alveolare per rottura delle giunzioni delle cellule alveolari
- Accumulo di liquido alle basi







Cause

1. INCREMENTO PRESSIONE IDROSTATICA

Insufficienza cardiaca congestizia (comune) (incremento della pressione venosa polmonare)


Ostruzione vena polmonare

2. DIMINUZIONE PRESSIONE ONCOTICA

ipoalbuminemia
- malnutrizione
- sdr nefrosica
- danno epatico
- perdita proteica in corso di enteropatie


Come si vede l’edema macroscopicamente ?


- Nel tessuto polmonare fisiologicamente c’è aria e sangue





- Nel tessuto polmonare con edema c’è accumulo di liquidi





Materiale schiumoso


Edema polmonare


Aspetti microscopici

I capillari sono congesti.

Gli alveoli contengono un materiale omogeneo o finemente granulare debolmente eosinofilo (rosa pallido)

Il **liquido è un trasudato** costituito da un ultrafiltrato del plasma a basso contenuto proteico e cellulare
Acqua ed elettroliti. Rappresentano la componente principale del fluido, con concentrazioni di ioni (sodio, potassio, cloro) e piccole molecole sovrapponibili a quelle del plasma






La congestione polmonare, con dilatazione dei capillari e microemorragie negli alveoli, determina un aumento dei macrofagi carichi di emosiderina (siderofagi)

Nella congestione polmonare cronica (stenosi mitralica)

Macrofagi carichi di emosiderina



2. Edema polmonare da lesione della membrana alveolo-capillare

- Lesione dell'endotelio vasale e dell'epitelio alveolare circoscritta o diffusa

- Cause:
  - polmoniti batteriche o virali,
  - shock settico, traumatico,
  - inalazione di tossine od agenti irritanti,
  - abuso di sostanze stupefacenti,
  - reazione da ipersensibiltà a solventi organici,

Caso clinico

Ragazza di 22 anni

Difficoltà a respirare (dispnea) a riposo e **dolore toracico**

- Radiografia
- Alto valore del *D-dimero*
- L'**angioTC** evidenzia un coagulo nell'arteria polmonare (embolia polmonare).

Embolia polmonare

Embolia polmonare consiste nell'ostruzione dell'arteria polmonare o di una delle sue ramificazioni

Causata da materiale **(solido, gassoso o liquido)** proveniente dal circolo sanguigno periferico.

L'embolia polmonare è la terza patologia cardiovascolare acuta più comune a livello mondiale, dopo l'infarto del miocardio e l'ictus

I fattori di rischio possono essere suddivisi in genetici e acquisiti.

I fattori genetici comprendono condizioni di ipercoagulabilità, come la mutazione del fattore V di Leiden, le mutazioni della protrombina, la sindrome da anticorpi antifosfolipidi.

I fattori di rischio acquisiti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Gravidanza
Ospedalizzazione (principale causa di morte nel 10% degli adulti ospedalizzati)
Obesità
Contraccettivi orali.
Neoplasie
Soggetti immobilizzati per fratture
Presenza di cateteri venosi centrali
Interventi di artroplastica.

Più frequente in soggetti con patologie croniche o tumori oppure in soggetti immobilizzati per fratture.

Oppure in stati di ipercoagulabilità:

Primari (mutazioni protrombina, fattore V Leiden, sdr ab antifosfolipidi)

Secondari (contraccettivi orali, tumori, gravidanza, recente intervento chirurgico)

Embolia polmonare

Risposta fisiopatologica e quadro clinico

DIPENDONO DA:

1) Estensione dell'ostruzione al flusso dell'arteria polmonare/diramazione
2) Dimensioni dei vasi occlusi
3) Numero di emboli
4) Condizioni del sistema cardiocircolatorio

- Gli **emboli grossi** causano morte istantanea, oppure possono imitare un infarto del miocardio (grave dolore toracico, dispnea, shock)
- I **piccoli emboli** solitamente si riassorbono, oppure, quando multipli, causano piccoli infarti, ipertensione polmonare e cuore polmonare cronico
- L'irrorazione delle arterie bronchiali supplisce alla ischemia nei soggetti con adeguata funzione cardiocircolatoria.

Embolia polmonare

Conseguenze fisiopatologiche

Compromissione respiratoria

Dovuta alla presenza di segmenti polmonari ventilati ma non perfusi

Compromissione dinamica


Dovuta all'aumento delle resistenze al flusso polmonare a causa dell'ostruzione embolica

Embolia dell'arteria polmonare

- Questi trombi originano caratteristicamente dalle vene delle gambe o pelviche di soggetti immobilizzati.

- Possono contribuire i traumi alle estremità, l'ipercoagulabilità (s. di Trousseaus - **tromboflebite recidivante migrante sdr paraneoplastica -** nei pazienti con carcinomi; uso di contraccettivi orali)

- Gravidanza



Embolo a cavaliere

Macroscopica

Embolo a sella a livello della biforcazione dell'arteria polmonare

Causa la morte improvvisa.

I trombi hanno spesso la forma del vaso da cui originano, mostrano una superficie lievemente irregolare ed aree di colorito rosso-bruno alternate ad aree bianco-giallastre, dovute alla presenza di strati ricchi rispettivamente di eritrociti e di fibrina/piastrine **(linee di Zahn)**.

Se la trombolisi non avviene entro 1-2 giorni, il tromboembolismo viene organizzato dall'intervento di fibroblasti e miofibroblasti che migrano al suo interno.



Embolia dell'arteria polmonare

Macroscopica

Aspetto stratificato dell'embolo




Embolia dell'arteria polmonare

Linee di Zahn
Strie rosse alternate a strie rosa pallido caratteristiche del trombo.

Costituite da emazie, piastrine e fibrina






Occlusione trombotica di un piccolo ramo arterioso

Piccoli emboli non danno sintomi se non sono multipli o ripetuti in breve tempo


Possono causare ipertensione polmonare se ripetuti nel tempo




Trombo organizzato di un ramo della polmonare


Se la trombolisi non avviene entro 1-2 giorni, il tromboembolismo viene organizzato dall'intervento di fibroblasti e miofibroblasti che migrano al suo interno.

A destra del residuo fibroso sono presenti placche ateromasiche intimali.






Emboli di altra natura



Talco

Magnesio trisilicato (talco), l'amido e la cellulosa, sono impiegate come eccipienti nella produzione dei farmaci e/ droghe.
Anfetamine e sostanze vengono polverizzate e diluiti per essere poi iniettati per via endovenosa e poi sequestrate dal circolo polmonare, dove provocano trombosi e granulomi intravascolari.



Grasso

Embolizzazione del grasso midollare sembra derivare immancabilmente da una frattura delle ossa lunghe

CASO CLINICO

Una donna di 21 anni, senza probablematiche pregresse, si è presentata al pronto soccorso con un peggioramento delle condizioni generali, una grave mancanza di respiro, vertigini e parestesie bilaterali alle estremità. La paziente ha dichiarato di aver consumato occasionalmente protossido di azoto negli ultimi anni, ma nei quattro mesi precedenti l'esordio sintomatologico ne aveva consumato quantità sempre maggiori.

La paziente non fumava, non aveva una storia di trombosi e assumeva contraccettivi orali da diversi anni.

1. Primi esami:

Assenza di deficit neurologici focali;
Tachicardica (130 battiti/min);
Pressione arteriosa sistolica tra 90 e 110 mmHg.

Diagnosi differenziali:

embolia polmonare, polmonite, emoglobinuria parossistica notturna e un tumore

2. Esami successivi:

- elettrocardiografia: segni di sovraccarico del ventricolo destro;
- TAC vede **embolia polmonare (EP)** a cavaliere con segni di sovraccarico del ventricolo destro.

3. Esami di laboratorio

- troponina T, 50 ng/L (valore di riferimento <15 ng/L). La presenza di **troponina T alta** in un paziente con **embolia polmonare** indica un danno miocardicosecondario alla sofferenza del ventricolo destro
- omocisteina, 78 mmol/L (valore di riferimento <15 mmol/L);
- vitamina B12, 500 pmol/L (entro l'intervallo di riferimento).

Progressione e ulteriori risultati

- Al secondo giorno di ricovero, la paziente continuava a essere confusa e debole. Le condizioni neurologiche erano peggiorate e una successiva TC dell'encefalo (al terzo giorno di ricovero) ha rivelato un **recente infarto cerebrale centrale sinistro.**

- Un ecocardiogramma ha mostrato un ventricolo destro dilatato con un **trombo nel ventricolo destro.**

- La risonanza magnetica cerebrale del giorno 4 ha rivelato una trombosi dell'arteria basilare e ha confermato la presenza di estesi infarti ischemici dell'emisfero sinistro.
- Un'analisi genetica del polimorfismo della metilenetetraidrofolato reduttasi (MTHFR) ha rivelato un'omozigosi per la variante MTHFR 1286 A>C, che può portare a livelli di omocisteina leggermente elevati.

- Altre possibili cause di trombosi, come l'emoglobinuria parossistica notturna, sono state prese in considerazione ma escluse. Anche diversi esami radiologici e del sangue hanno permesso di escludere una patologia maligna.

TERAPIA E DECORSO CLINICO


La paziente era stata inizialmente trattata con eparina a basso peso molecolare e vitamina B12 orale e ricoverata in preparazione alla trombolisi.

Tuttavia, a causa dell'identificazione dell'infarto cerebrale la trombolisi è stata considerata controindicata. Il trombo è stato quindi rimosso meccanicamente (trombectomia endovascolare polmonare).

Tra gli **effetti del protossido di azoto**
Stordimento
Vertigini
Incoordinazione dei movimenti
Effetti psichedelici.
L'esposizione prolungata può causare amnesia, afasia, sincope, aritmia e, soprattutto se combinata con l'assunzione di alcol, asfissia

Poiché causa inattivazione della vitamina B_{12}, un uso prolungato o frequente di protossido di azoto può comportare alterazioni megaloblastiche del midollo, mieloneuropatia

L'uso di protossido d'azoto può causare ipercoagulabilità del sangue, aumentando il rischio di **trombosi venosa profonda e embolia polmonare.**.


SYMPTOMS
Chest pain
Shortness of breath
Coughing
CAUSES
Deep Vein Thrombosis
Surgery/on immobilization
Smoking/birth control pills
DIAGNOSIS
CT scans
d-dimer blood tests
Ultrasound
TREATMENT
Anticoagulants
Thrombolytic therapy
Surgical procedure if needed
PULMONARY EMBOLISM:
SYMPTOMS, CAUSES, DIAGNOSIS, AND TREATMENT

Embolo a cavaliere/Grossi emboli

CAUSA DI MORTE

Determina morte improvvisa dovuto all'interruzione del flusso ematico attraverso i polmoni, impedisce il passaggio di ossigeno

Insufficienza acuta del cuore destro costituisce un'ulteriore causa di morte

Emboli piccoli

Riescono a raggiungere i vasi più periferici dove possono provocare **infarti polmonari** nei pazienti con malattie cardiache o polmonari.

Tuttavia nei pazienti giovani con funzione cardiocircolatoria normale, le arterie bronchiali possono possono sostenere l'apporto di sangue polmonare
Si possono verificare emorragie ma non infarto

INFARTO POLMONARE

Si manifesta quando l'ostruzione di un'arteria polmonare da parte di un embolo blocca l'afflusso di sangue e ossigeno, causando la morte (*necrosi*) di una porzione di tessuto polmonare

L'**infarto polmonare** è una rara complicanza
(si verifica in circa il 10% dei casi) dell'embolia polmonare.

PERCHÉ in una percentuale bassa??

INFARTO POLMONARE È EMORRAGICO

Componente emorragica


Il polmone è protetto da **un doppio afflusso sanguigno** (arterie polmonari e arterie bronchiali) e dalla ventilazione, quindi l'infarto è raro.

Tuttavia, se è presente una congestione passiva (come in caso di insufficienza cardiaca) o un circolo bronchiale insufficiente, il sangue si riversa negli alveoli danneggiati, causando un'emorragia locale e la necrosi del tessuto

Blocco dell'afflusso di sangue e ossigeno, causa la *necrosi* del tessuto polmonare

Infarto polmonare

- È classicamente **emorragico**, con caratteristica forma di cuneo con apice rivolto verso l'ilo.




Macroscopica

Area priva di aria, rosso scura, compatta e ben delimitata, di forma conica o piramidale con base alla periferia ed apice verso l'ilo;


La base corrisponde alla superficie pleurica, che è spesso ricoperta da un sottile velo di fibrina (pleurite da infarto)

All'apice del triangolo è spesso possibile riscontrare il vaso arterioso occluso dall'embolo che sporge dalla boccuccia beante del vaso sezionato.



Diagnosi differenziale vs atelettasia


La **superficie di taglio**, rossoscura, soda ed asciutta, e la rilevatezza dei margini rispetto al parenchima circostante sono i caratteri che servono a differenziare gli infarti dalle *aree atelettasiche*, le quali possono essere rossoscure e cuneiformi, ma sono *molli, umide e rientranti sulla superficie esterna.*




Istologia

Nell'**infarto recente** gli alveoli, i dotti alveolari ed i piccoli bronchi appaiono infarciti di **globuli rossi**; il normale disegno polmonare è ancora riconoscibile ma (contrariamente a quanto si verifica nei comuni focolai emorragici) le pareti alveolari sono necrotiche, specie nelle parti centrali dell'infarto.

Nella successiva evoluzione, i globuli rossi vanno incontro a degradazione e l'emoglobina degradata viene in parte trasformata in emosiderina (l'infarto tende pertanto a cambiare colore, assumendo un colorito giallo-brunastro), mentre alla periferia della zona necrotica si accumulano leucociti e macrofagi:






Istologia - Evoluzione

A **partire dalla seconda settimana** si sviluppa, ai limiti dell'infarto, un tessuto di granulazione, ricco di vasi e di istiociti, che invade progressivamente il tessuto necrotico e, poco a poco, lo demolisce e lo riassorbe; alla fine, ad opera dei fibroblasti e della neoformazione di fibre collagene, l'intero focolaio viene sostituito da un tessuto connettivo in evoluzione sclerotica, e si sviluppa una cicatrice rientrante ricoperta dalla pleura ispessita.



Lung Infarct:

Gross fixed tissue but excellent color section through left lung with large infarct in lower lobe



Thromboembolus And Infarct:


Gross natural color frontal section right lung with large embolus and infarct in middle lobe



Piccolo infarto polmonare

- I piccoli emboli producono nei pazienti con sistema cardiovascolare normale soltanto un dolore toracico transitorio e tosse.

- I piccoli infarti si manifestano con dispnea, tachipnea, febbre, dolore toracico, tosse, emottisi e raramente, limitati versamenti pleurici



Ipertensione polmonare IP

In condizioni normali, la pressione polmonare è 1/6-1/8 di quella sistemica pari a 25 mmHg.

IP definita >25 mm Hg a riposo

L'ipertensione polmonare può essere:

- Idiopatica

Oppure

- Secondaria a malattia polmonare cronica ostruttiva o restrittiva
- Secondaria ad embolie ripetute
- Secondaria a malattie cardiache

Infezioni polmonari

POLMONITI

Classificazione

Criterio eziologico

- Batteriche
- Virali

Criterio istopatologico

- Alveolare (Tipiche)
- Interstiziale (Atipiche)

Classificazione Epidemiologica

- Polmonite acquisita in comunità
  (community-acquired pneumonia, CAP)
- Polmonite nosocomiale
  (hospital-acquired pneumonia, HAP)
- Polmonite nell'ospite immunocompromesso

POLMONITE ACQUISITA IN COMUNITÀ (CAP)

Si definisce polmonite acquisita in comunità (CAP) una polmonite che si manifesta in un paziente non ospedalizzato oppure ricoverato da meno di 48-72 ore

POLMONITI ACQUISITE IN AMBIENTE OSPEDALIERO (HAP)

Si definisce polmonite acquisita in ambiente ospedaliero (HAP) una polmonite che si sviluppa almeno 48 ore dopo il ricovero oppure che compare in meno di 7 giorni dopo la dimissione.

POLMONITI NEL PAZIENTE IMMUNOCOMPROMESSO

Si definisce immunocompromesso un soggetto che presenti un deficit congenito o acquisito della immunità cellulo-mediata.

POLMONITE

Acquisita in comunità 20%

- Tipica
  - Strep.pneumoniae
  - H. influenzae
- Atipica
  - Mycopl. pneumoniae
  - Chlam. pneumoniae

Nosocomiali 60%

- Manovre e strumentazione chirurgica
- Personale sanitario
- Contaminazione ambientale

Pseudomonas aer
Bacilli Gram – (Klebsiella)
Legionella pneumophila
Staph.aureus

Immuno compromesso

Pneum.carinii
Cytomegalovirus
Aspergillus spp
Candida spp.
M.tuberculosis

POLMONITI

Classificazione anatomopatologica

- **Polmoniti alveolari (tipiche):**

essudato e ricca componente cellulare, estensione lobare o a focolaio, frequente compromissione bronchiale, eziologia per lo più batterica

- **Polmoniti interstiziali (atipiche):**

interstizio infiltrato da cospicua componente linfocitaria, eziologia per lo più virale, da Mycoplasma o Clamydia.

Polmonite batterica presenta due quadri di distribuzione anatomica

1. **Broncopolmonite** : addensamento parcellare del polmone

2. **Polmonite lobare** : addensamenti suppurativo di gran parte di un lobo o di un intero lobo

Broncopolmonite lobulare

- Addensamento flogistico acuto suppurativo
  - Lobare
  - Multilobolare
  - Bilaterale



© Elsevier 2005





Le aree nodulari biancastre sono focolai di flogosi acuta (aree di consolidamento lobulare) e ricalcano la disposizione dei lobuli polmonari

(da qui il termine “polmonite lobulare”).

Broncopolmonite lobulare

- Macro
  - Lesioni granulari, asciutte
  - rilevate
  - Ø 3-4 cm
  - Grigio-rossastro-giallo
- Micro
  - Essudato purulento
  - Bronchi, bronchioli, spazi alveolari




© Elsevier 2005

Polmonite lobare




© Elsevier 2005

Polmonite Lobare







Pleurite

POLMONITE ALVEOLARE O LOBARE

Streptococcuss pneumoniae

I STADIO (ingorgo e congestione): 1°- 2°giorno

II STADIO (epatizzazione rossa): 3°- 4°giorno

III STADIO (epatizzazione grigia): 5°- 6°giorno

IV STADIO (risoluzione): 7°- 8°giorno

processi regressivi litici; scomparsa rete di fibrina; ripresa circolazione interstiziale


FASE CONGESTIONE

l parenchima colpito è aumentato di peso e di consistenza, di colore rosso scuro.

Alveoli riempiti di **essudato sieroso o siero-fibrinoso** ricco di pneumococchi e di **globuli rossi**. I setti sono ispessiti, edematosi con vasi dilatati e congesti.

Dura 1-2 giorni.





CONGESTIONE

Iperemia e accumulo di essudato negli alveoli con pochi neutrofili e numerosi batteri

Congestione: durata di circa un giorno.
Corrisponde alla **colonizzazione batterica** del parenchima polmonare (soprattutto a carico dei lobi inferiori e del lobo medio) che determina **congestione vascolare** e formazione di **essudato intralveolare** in cui sono presenti pochi neutrofili e **numerosi batteri.**

Epatizzazione rossa

Polmone rosso, privo di aria.

La zona colpita ha l'aspetto e la consistenza del fegato.

- Dura 3-4 giorni





Epatizzazione rossa

Esame microscopico: essudato fibrinoso, coagulazione massiva.


Gli alveoli non contengono più aria, ma rete di fibrina con pneumococchi, globuli rossi e cellule infiammatorie.


Essudazione fibrino-purulenta negli alveoli.

Si associa pleurite focale


Epatizzazione rossa

Gli alveoli si riempiono di emazie e cellule infiammatorie





Epatizzazione rossa: dovuta alla **risposta flogistica** con aumento dell'**iperemia** e dell'**essudazione**; quest'ultima diviene **più fluida** e può causare la diffusione dell'infezione agli alveoli contigui. **Fibrina, neutrofili infarciti di pneumococchi e globuli rossi** migrati dai capillari iperemici e permeabilizzati, si accumulano nelle cavità alveolari conferendo al parenchima caratteristiche macroscopiche di **consistenza simile a quelle epatiche**


Stadio dell' Epatizzazione rossa
©1995 Cornell University Medical College

Epatizzazione grigia

Il tessuto epatizzato è di colore grigio.
Polmone al taglio è asciutto


Microscopicamente: disgregazione dei globuli rossi.
Persistenza essudato fibrinoso suppurativo.

L'interstizio è compresso dall'essudato alveolare, non più congesto.


Epatizzazione grigia

Polmone asciutto

Epatizzazione rossa




Epatizzazione grigia



Epatizzazione grigia.

Infiltrato alveolare è costituito prevalentemente da polimorfonucleati.
Disgregazione dei GR, prevalenza di cellule infiammatorie e di essudato fibrinoso




Epatizzazione grigia: degradazione dei neutrofili e globuli rossi, prosegue il deposito di fibrina. L'essudato inizia a retrarsi progressivamente

Stadio dell' Epatizzazione grigia



©1995 Cornell University Medical College



Quarto stadio. Risoluzione

Colliquazione della fibrina, lisi dei granulociti (liberazione di enzimi proteolitici).
Consistenza molle dell'area polmonare interessata.

Prevalenza di macrofagi→ rimozione del materiale accumulato negli alveoli.

La microcircolazione dei setti riprende; il materiale endo-alveolare viene espulso o riassorbito per via linfatica, l'aria torna a riempire gli alveoli.

ANATOMIA PATOLOGICA

STADIO DELLA CONGESTIONE

Iperemia e accumulo di essudato negli alveoli con pochi neutrofili e numerosi batteri.

STADIO DELLA "EPATIZZAZIONE ROSSA"

Sintomi e segni di infiammazione acuta, dovuti a essudazione alveolare, e con stravaso di GR attraverso le membrane alveolari.

STADIO DELLA "EPATIZZAZIONE GRIGIA"

Disgregazione dei globuli rossi, prevalenza di cellule infiammatorie e di essudato fibrinoso.

STADIO DELLA RISOLUZIONE

L'essudato, per digestione enzimatica, evolve in una sostanza semifluida che viene fagocitata dai macrofagi assieme ai detriti
presenti: la struttura del polmone ritorna alla normalità.

Polmonite acuta: agenti eziologici batterici

TABLE 69-1A Causative Agents of Acute Pneumonia: Bacteria

COMMON	UNCOMMON
Streptococcus pneumoniae	*Acinetobacter* spp.
Staphylococcus aureus	*Actinomyces* and *Arachnia* spp.
Haemophilus influenzae	*Bacillus* spp.
Mixed anaerobic bacteria (aspiration)	*Moraxella catarrhalis*
Bacteroides spp.	*Campylobacter fetus*
Fusobacterium spp.	*Eikenella corrodens*
Peptostreptococcus spp.	*Francisella tularensis*
Peptococcus spp.	*Neisseria meningitidis*
Prevotella spp.	*Nocardia* spp.
Enterobacteriaceae	*Pasteurella multocida*
Escherichia coli	*Proteus* spp.
Klebsiella pneumoniae	*Burkholderia pseudomallei*
Enterobacter spp.	*Salmonella* spp.
Serratia spp.	*Enterococcus faecalis*
Pseudomonas aeruginosa	*Streptococcus pyogenes*
Legionella spp. (including *L. pneumophila* and *L. micdadei*)	

POLMONITE BATTERICA

Streptococcus pneumoniae è l'agente più isolato nella "polmonite di comunità" (responsabili del 90% di tutti i casi di polmonite)

Come funziona il vaccino antipneumococcico?

Sono disponibili **due tipi** di vaccino antipneumococcico:

- **Coniugato 13-valente** (PVC13): per i lattanti e i bambini fino a 5 anni; efficace contro i 13 ceppi responsabili della maggior parte delle infezioni più gravi. Si tratta di un vaccino inattivato e coniugato ovvero ottenuto con frammenti del batterio e poi legato a una proteina in grado di aumentarne l'efficacia.
- **Polisaccaridico 23-valente**: utilizzato prevalentemente negli adulti.

POLMONITE BATTERICA

Altre specie raramente causa di polmonite batterica

Staphylococcus aureus


Haemophilus influenzae


Streptococcus pyogenes

Klebsiella pneumoniae.

Staphylococcus aureus

Può essere causa di polmonite in soggetti a rischio come bambini, anziani e soggetti ospedalizzati, con fibrosi cistica o come polmonite batterica secondaria a infezione virale da virus influenzale.






Haemophilus influenzae

Spesso causa di polmonite batterica (la più diffusa dopo quella da Streptococcus pneumoniae).


In particolare, ceppi capsulati contenenti il polisaccaride capsulare tipo B (Hib) sono i più virulenti in grado di dare forme polmonite, soprattutto nei bambini di età inferiore ad 1 anno, ed anche meningiti ed epiglottiti



I **bacilli Gram-negativi** raramente (< 2%) causano polmonite "community-acquired", ma sono responsabili della maggior parte delle polmoniti nosocomiali, in genere in pazienti sottoposti a ventilazione assistita

Specie responsabili:

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter sp, *Proteus* sp, *Serratia marcescens,* and *Acinetobacter* sp.



Condizioni cliniche che si possono associare ad un aumentato rischio di polmonite e loro conseguenze

Condizione	Conseguenze
BPCO	Ipossia ed ipossiemia. Compromissione clearance mucociliare e alterazione attività macrofagica
Edema polmonare	Alterazione attività macrofagica
Compromissione stato di coscienza	Polmonite "ab ingestis"
Virosi recente	Compromissione clearance mucociliare, alterazioni dell'adesività batterica (>)

COMPLICANZE

- ASCESSO: una delle complicanze più temibili; è una raccolta di pus in una cavità NEOFORMATA!! Il pus può farsi strada verso l'esterno o verso la pleura
- EMPIEMA: è una raccolta di pus in una cavità GIA' FORMATA. Se il pus giunge alla pleura si avrà empiema pleurico.
- Infarti ischemici
- PERICARDITE PURULENTA
- Triade di Marchiafava
- Insufficienza MIOCARDICA per aumento pressione polmonare
- Morte

Quando si diagnostica una polmonite lobare bisogna stabilire se c'è sepsi o meno; se c'è sepsi il trattamento è diverso. Per capire se è presente sepsi o meno è utile ricordare la **TRIADE METAPNEUMONICA DI MARCHIAFAVA** che racchiude le manifestazioni tipiche della sepsi pneumococcica, cioè:
Polmonite lobare + Meningite pneumococcica + Endocardite batterica acuta!

Complicazioni possono insorgere quando la malattia viene trascurata o non adeguatamente trattata

Ascesso polmonare


Versamento pleurico e pleurite


Sepsi generalizzata

Complicanze della broncopolmonite:

Ascesso polmonare

- *Processo suppurativo locale del polmone, caratterizzato da necrosi del tessuto polmonare*






Eziologia

- Streptococchi (aerobi/anaerobi)
- Staphilococcus aureus

Ascesso polmonare

Le pareti dell'alveolo sono distrutte dall'infiltrato infiammatorio




Complicanze della broncopolmonite:

Pleuriti e pericarditi

Diretta diffusione di focolaio broncopneumonico

Pleurite interlobare



POLMONITE ATIPICA/INTERSTIZIALE

POLMONITE ATIPICA

sostenuta da microrganismi diversi tra cui

- Mycoplasma pneumoniae
- Legionella

- Virus (RSV, adenovirus, coronavirus …etc)

- **Funghi:** Cryptococcus neoformans, Aspergillus e Candida sono responsabili di polmonite in pazienti immunodepressi.

Mycoplasma pneumoniae

POLMONITE ATIPICA PRIMARIA

Maggiore causa di polmonite atipica primitiva

(≈ 20% di tutte le polmoniti)

E' il più comune agente di infezioni polmonari nella fascia di età tra 5 e 35 anni.

E' responsabile di epidemie (scuole, caserme) che si diffondono lentamente poichè il periodo di incubazione è di 10-14 giorni.

Quadro anatomopatologico

• Polmonite interstiziale, più accentuata nelle zone adiacenti ai bronchi e bronchioli


• I setti alveolari sono ispessiti, con dilatazione dei capillari e infiltrazione di elementi mononucleati (linfociti, monociti)

• Gli alveoli sono poco interessati: l'aria all'interno è ridotta ma non abolita (non c'è dispnea ma tosse stizzosa)


Polmonite interstiziale (Atipiche) (virale)

I setti alveolari sono ispessiti, con dilatazione dei capillari e infiltrazione di elementi mononucleati (linfociti, monociti)

A differenza delle polmoniti batteriche, scarso essudato intra-alveolare,



POLMONITE INTERSTIZIALE




ESAMI DI LABORATORIO

Alveolari	Interstiziali
• leucocitosi neutrofila	• numero di leucociti può essere normale
• VES e altri indici di flogosi aumentati	• VES può essere nei limiti

RADIOGRAFIA DEL TORACE


Alveolari


- una o più aree di opacità omogenea
- nei casi tipici l'addensamento è a limiti lobari
- dati corrispondenti a quelli rilevabili all'esame obiettivo



Interstiziali

- Accentuazione della trama alveolare
- infiltrato peri-ilare bilaterale e quadro reticolo nodulare diffuso
- discrepanza fra obiettività e radiologia





Polmonite lobare – Radiografia del torace. Addensamento parenchimale a carico del polmone destro che interessa il lobo medio, con modesto broncogramma aereo nel contesto



Polmonite interstiziale – Radiografia del torace. Interessamento flogistico dei tessuti interstiziali. Aspetto a vetro smerigliato

CORRELAZIONE ANATOMO-CLINICA

Diagnosi differenziale fra polmonite tipica ed atipica

	TIPICA	ATIPICA
Storia clinica	Esordio rapido con febbre alta e brividi	Subdola (oltre 5 – 7 giorni)
Radiologia	Intralveolare	Interstiziale
Es. obiettivo	Consolidamento sempre presente	Consolidamento spesso presente
Età	Ogni età	Adolescenti
Dolore pleurico	Frequente	Raro
Conta leucocitaria	Aumentata (PMN ≥ 12.000 mm^3)	Normale o leggermente aumentata

Polmoniti atipiche

- **I pazienti sono in genere in buona salute e le cui condizioni cliniche tendono ad essere migliori del rispettivo quadro radiologico (*dissociazione clinico-radiologica*).**

POLMONITI
in età pediatrica

Per la diagnosi di polmonite in età infantile è molto importante valutare la frequenza respiratoria in base ai criteri WHO:

- **nei bambini <2 mesi: FR > 60 atti/min**
- **nei bambini 2-12 mesi: FR > 50 atti/min**
- **nei bambini >12 mesi: FR > 40 atti/min**


16-20 atti respiratori per minuto (adulto)


EZIOLOGIA DELLA POLMONITE CONTRATTA IN COMUNITÀ NEL BAMBINO

Batteri maggiormente responsabili

	< 3 mesi	4 mesi - 4 anni	≥ 5 anni
Streptococco pneumoniae	+++	++++	+++
Emofilo	+	+++	+
Streptococco A	-	+	+
Streptococco B e D	+++	-	-
Stafilococco	++	+	+
Enterobacilli	+++	+	-
Micoplasma	-	++	+++
Clamidia	++	-	-

RX-TORACE DI POLMONITE DA MYCOPLASMA PNEUMONIAE





RX: aumento diffuso e marcato dell'interstizio polmonare con immagini micronodulari e ili ingranditi