








SVILUPPO PRECOCE DEL RICCIO DI MARE




Protostomi: nel canale alimentare si forma prima la bocca
Deuterostomi: nel canale alimentare la bocca si forma per ultima





L'embrione di riccio di mare presenta degli assi di polarità'



Inoltre, presenta altre caratteristiche che lo rendono un valido organismo modello in biologia dello sviluppo:

sviluppo embrionale esterno

elevato numero di gameti e di embrioni che si possono far sviluppare in modo sincronizzato

tempi brevi di sviluppo (48 ore)



embrione trasparente

facile manipolazione


Figura 9

SEGMENTAZIONE


Uovo oligolecitico – Segmentazione oloblastica radiale subeguale




Notare la posizione e orientamento dei fusi mitotici!




Ovocyte




œuf mûr




œuf fécondé




2 cellules




4 cellules




8 cellules




16 cellules



32 cellules




Morula




Blastocèle

Jeune blastula



Blastula




Blastula à l'éclosion

Mesomeri



Macromeri


Micromeri



9 hr

9.5 hr

10 hr



10.5 hr

11 hr

11.5 hr

Blastopore



12 hr

13 hr

13.5 hr

Syncytial cables





15 hr

17 hr

18 hr

Blastopore


Syncytial cables



24 hr



DEVELOPMENTAL BIOLOGY 11e, Figure 10.10
 © 2016 Sinauer Associates, Inc.

Iniezione di colorante vitale nei macromeri




La colorazione si ritrova nell'endoderma e nel mesenchima secondario della larva


Mappa dei territori presuntivi



A Sea urchin development




Color key	■ Ectoderm	■ Skeletogenic mesoderm
	■ Endoderm	■ Non-skeletogenic mesoderm








Formazione blastocele

- Alta affinità tra i blastomeri
- Deposizione di proteoglicani nella cavità blastocelica
- Forza centrifuga che determina il progressivo allontanamento dei blastomeri.



Gastrulazione

TABLE 1.1 Types of cell movement during gastrulation^a



Type of movement	Description	Illustration	Example
Invagination	Infolding of a sheet (epithelium) of cells, much like the indentation of a soft rubber ball when it is poked.		Sea urchin endoderm
Involution	Inward movement of an expanding outer layer so that it spreads over the internal surface of the remaining external cells.		Amphibian mesoderm
Ingression	Migration of individual cells from the surface into the embryo's interior. Individual cells become mesenchymal (i.e., separate from one another) and migrate independently.		Sea urchin mesoderm, <i>Drosophila</i> neuroblasts
Delamination	Splitting of one cellular sheet into two more or less parallel sheets. While on a cellular basis it resembles ingression, the result is the formation of a new (additional) epithelial sheet of cells.		Hypoblast formation in birds and mammals
Epiboly	Movement of epithelial sheets (usually ectodermal cells) spreading as a unit (rather than individually) to enclose deeper layers of the embryo. Can occur by cells dividing, by cells changing their shape, or by several layers of cells intercalating into fewer layers; often, all three mechanisms are used.		Ectoderm formation in sea urchins, tunicates, and amphibians

^a The gastrulation of any particular organism is an ensemble of several of these movements.


Ingressione o immigrazione

Ingression

Migration of individual cells from the surface into the embryo's interior. Individual cells become mesenchymal (i.e., separate from one another) and migrate independently.



Blastula avant la gastrulation



Début de la gastrulation











Figura 5

Mesenchima primario → Scheletro calcareo della larva







Ingressione o immigrazione






- Ridotta affinità tra i blastomeri
- Ridotta affinità per lo strato ialino
- Aumentata affinità per le proteine del blastocele


ECM in the sea urchin embryo




TRANSIZIONE EPITELIO-MESENCHIMATICA: meccanismo alla base del movimento di ingressione



**I MOVIMENTI DI IMMIGRAZIONE SONO MEDIATI DA INTERAZIONI
CON LA MATRICE EXTRA-CELLULARE PRODotta DALLE CELLULE
CHE RIVESTONO IL BLASTOCELE**



**LE CELLULE MESENCHIMATICHE MIGRANTI ESPRIMONO
INTEGRINE SULLA MEMBRANA CELLULARE**






Invagination

Infolding of a sheet (epithelium) of cells, much like the indentation of a soft rubber ball when it is poked.



Epiboly

Movement of epithelial sheets (usually ectodermal cells) spreading as a unit (rather than individually) to enclose deeper layers of the embryo. Can occur by cells dividing, by cells changing their shape, or by several layers of cells intercalating into fewer layers; often, all three mechanisms are used.




Epibolia

Invaginazione delle cellule derivate dai macromeri
Epibolia dell'ectoderma

Invaginazione


Meccanismi del movimento di invaginazione: cause estrinseche

(A)




Blastoporo

(B)





(C)



- deposizione di proteoglicani nello strato ialino
- rigonfiamento dello strato ialino


Meccanismi del movimento di invaginazione: cause intrinseche

Apical Constriction and Invagination





apical actomyosin complex undergoes contraction to buckle epithelium


Cellule a cuneo




Blastula






Gastrula






Meccanismi di formazione dell'archenteron: movimento di estensione convergente causato da processi di intercalazione medio-laterale



GASTRULAZIONE INIZIALE



GASTRULAZIONE AVANZATA





Meccanismi di formazione dell'archenteron: ruolo del mesenchima secondario




Vescicole celomatiche

Muscolatura larvale


Contribuisce al contatto tra archenteron
e la regione dello stomodeo (bocca)
tramite contrazione di filopodi









SMCs are Required Late in Gastrulation







Overview of Archenteron Elongation





Formazione della larva pluteo

Formation de la larve pluteus




Larve pluteus







Blastula nageuse



Gastrula avec mésenchyme primaire




Mésenchyme primaire




Mésenchyme secondaire

Archentéron



Vésicules coelomiques




Gastrula avec archentéron et mésenchyme secondaire



Jeune pluteus
vue ventrale



Pluteus âgées en vues ventrale et latérale



Rudimento immaginale

Sviluppo dell'embrione di riccio di mare. Parte seconda: dalla gastrulazione all'inizio della metamorfosi. La gastrulazione avviene in diverse fasi e produce la cavità interna con cellule dalle quali si originano gli organi interni. La larva risultante è chiamata pluteo. È rappresentato uno solo degli stadi che partono dalla metamorfosi della larva, a simmetria bilaterale, per arrivare al riccio di mare adulto, a simmetria pentaraggiata.