



Colchico o croco autunnale o zafferano bastardo (*Colchicum autumnale*)



Pianta erbacea **perenne**, presente in zone montane e submontane il cui organo **perennante** è il **bulbo-tubero** da cui ogni anno nascono fiori (autunno) e foglie (primavera)



- Presente
- Segnalazioni errate



Liliaceae
Angiosperme-Monocotiledoni



Bulbo-tubero

Piriforme, con una faccia arrotondata ed un lato piatto

Dopo la formazione del frutto, il bulbo appassisce ma, dal lato piatto, spunta un nuovo bulbo (all'inizio dell'estate)

SQUAME SCURE (ESTERNO)

INTERNO BIANCO

I **bulbi-tuberi** differiscono dai bulbi perché internamente sono costituiti da tessuto di riserva derivante dal fusto.

I **bulbi**, invece, presentano squame derivanti da modificazioni delle foglie che si dispongono attorno ad un fusto estremamente raccorciato, da cui partono le radici avventizie.

In autunno da un bulbo si formano 1-3 fiori (TRIMERI) con ovario localizzato a livello del bulbo. I fiori possiedono **un tubo del perigonio** molto lungo (15 cm) con 6 lobi che si aprono apicalmente



In primavera, compaiono le foglie e successivamente il frutto (capsula); dopo la formazione del frutto, il bulbo diventa flaccido

AUTUNNO



PRIMAVERA-ESTATE





DROGA: Bulbo-semi

Per motivi ecologici, si evita la raccolta dei bulbi e si procede all'estrazione di alcaloidi dai semi



Semi piccoli, globosi, duri, ricoperti di un tegumento scuro, punteggiato, con **ispessimento** che contiene amido




Colchicina
VELENO MITOTICO



BLOCCA LA MITOSI (→ come antitumorale però non trova applicazione a causa della tossicità)

PER LO STUDIO DEI CROMOSOMI




ANTINFIAMMATORIO IN STATI GOTTOSI

Galanthus nivalis L. (Bucaneve) Amaryllidaceae



Pianta erbacea dal cui **bulbo** si estrae la *galantamina*

- Attraversamento BEE
- Inibitore dell'AChE
- Trattamento della malattia di Alzheimer



Galantamina



ovules in
three sections
(locules) within
the ovary



ovary wall

central axis
of the ovary -
ovules are
attached to this

VERATRO

Liliaceae
Angiosperme-Monocotiledoni

FOGLIE ALTERNE, INTERE E GUAINANTI, nervature parallele.

Il **RIZOMA** è circondato da molte radici tortuose



Un tempo usato come antiipertensivo

CONTIENE MOLTE SOSTANZE TOSSICHE e anche strutturalmente diverse tra loro (radici e rizoma)

Venature longitudinali che convergono all'apice

Melograno



FRUTTO: bacca (**balaustio**) frutto carnoso di forma sferica concresciuta con il calice

La dentellatura del calice rimane all'estremità superiore del frutto.

Semi con un una «polpa» succulenta e rossa, a forma di prisma.



- Antiossidante
- Leggera azione fitoestrogenica (**lignani**)



corteccia

- Alcaloidi (antelmintico)




Usò abbandonato



Il **sarcotesta** esterno
All'interno è presente una parte dura detta **sclerotesta**

Il genere *Taxus*


- ✓ Gimnosperme
- ✓ Alberi dioici, con foglie persistenti
- ✓ Tutta la pianta (eccez. arillo) è velenosa
- ✓ Semi parzialmente o totalmente circondati da un **arillo**
- ✓ In Europa è presente la specie *baccata*, in nord America la specie *brevifolia*



Taxine A



Distribuzione altitudinale



Taxus baccata



Albero che può arrivare a 15 metri
con **TRONCO CORTO E TOZZO**




Foglie lineari, acute all'apice, disposte su due linee, la nervatura centrale è evidente.






Male cone



**Arillo
(non tossico)**

**Seme
(tossico)**



5399521



Female cones


DATA LA TOSSICITA' si usa il tronco per la lavorazione del legno e le foglie per l'estrazione di precursori di molecole antitumorali

PEYOTE (Famiglia: Cactaceae) il cactus allucinogeno



Lophophora williamsii

Principi attivi: ~20 alcaloidi
Il più importante è il protoalcaloide mescalina



Provoca effetti simili a quelli del LSD

Parte ipogea molto sviluppata



Parte epigea (droga)
«bottoni vegetali»

Solo pochi conoscono dove trovare questo cactus, che si nasconde quasi tutto nei terreni aridi delle regioni più sperdute del Messico, dove viene venerato ed usato soprattutto nelle cerimonie sacre.

NESSUN IMPIEGO FARMACEUTICO




Uso illegale

KHAT: il tè abissinico o amfetamina naturale


Catha edulis



Le foglie si consumano fresche perché alcuni principi attivi si degradano col tempo



Catinone (costituente principale)
Simile all'amfetamina



amfetamina

EFFETTI: anoressizzante, tachicardia, insonnia, dipendenza psichica (non fisica), euforia, sensazione di benessere





Suffrutice da 0,4 a 2 m

Si trova in climi temperato-caldi del Mediterraneo, in India, in USA, ecc. specialmente in zone rocciose e sabbiose in climi aridi e semidesertici

Prevalentemente **dioico**

Rami abbondanti, sottili, con funzione clorofilliana


Foglie: squame (2-4 a livello dei nodi)-1-3 mm

Stròbili maschili e femminili



foglie

Ephedra sp (~40 specie)
Ephedraceae
GIMNOSPERME



Stròbilo maschile: riuniti in gruppetti sessili o brevemente pedunculati. I coni sono ovoidali numerose brattee e provvisti di un asse staminale che porta 7-8 antere gialle riunite in una colonna.

Stròbilo femminile: circondato da brattee che portano un ovulo. L' involucro a maturità diventa carnoso e colorato di rosso o di altri colori in base alla specie.

NON è UN FRUTTO!!




DROGA: rami giovani




Si riconoscono per il colore **verde** e l'aspetto **filiforme** (d= 1-2 mm)


PRINCIPI ATTIVI: alcaloidi, principalmente efedrina accompagnata da pseudoefedrina
Ad attività simpaticomimetica



Efedrina
(azione più prolungata rispetto all'adrenalina)



Pseudoefedrina
(azione più debole)



adrenalina

Effetti:

- aumento della forza di contrazione del cuore
- broncodilatatore
- vasocostrittore locale (rinite, sinusite)
- euforizzante



Contiene **pseudoefedrina** cloridrato



Diete dimagranti: ma è «**BANDITA**» a causa degli effetti collaterali



Altre fonti vegetali di alcaloidi

CICUTA (*Cicuta maculata*)



© 2003 Janet Novak



La cicuta si riconosce bene dalle altre Ombrellifere spontanee ed estive per essere più alta di un uomo e per le chiazze rosse ben evidenti sul fusto e sui rami. È una pianta molto comune nell'Italia centrale, ma ben visibile solo in estate e spesso affollata nei campi con le altre piante spontanee erbacee da cui si distigue per l'altezza.

(anche altre specie di cicuta sono tossiche)


Attenzione: la cicuta maculata, quando è giovane, può essere confusa con il **prezzemolo**

Se viene stropicciata emana un odore cattivo.
Anche i frutti (diachenii) hanno odore sgradevole
(odore di urina)



PRINCIPI ATTIVI DELLA CICUTA: ALCALOIDI PIPERIDINICI

Presenti in tutta la pianta, specialmente nel frutto



Coniina

ELEVATA TOSSICITÀ

$LD_{50} = 5 \text{ mg/Kg}$

6-8 FOGLIE SONO MORTALI

Esecuzioni capitali nell'antica Grecia



EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI DOSI ELEVATE

Paralisi alle estremità

Depressione respiratoria

Morte

A causa della tossicità oggi non trova impiego

Un tempo usata per **trattare la sintomatologia del tetano**




LA GINESTRA DEI CARBONAI (*Cytisus scoparius*, Fam. Fabaceae)




NON E' LA GINESTRA COMUNE (*Spartium junceum*, Fam. Fabaceae)

La ginestra comune non viene usata a scopo terapeutico per l'alto contenuto di *citisinga* (dai fiori si ottiene **un'essenza**)

Effetti come la nicotina



Sparteina
Presente soprattutto nei rami



chinolizidina

Attività cardiotonica (sparteina), ma molto forte (per cui l'uso è stato abbandonato); inoltre per la presenza di tiramina è controindicato negli ipertesi. La popolazione Africana ed Asiatica metabolizza la sparteina molto lentamente

Analogie e differenze tra ginestra dei carbonai e ginestra comune

Colore e dimensione del fiore simile

Calice bilabiato (ginestra dei carbonai)

Calice con un solo labbro (ginestra comune)

Stilo a forma di corno, avvolto su se stesso (ginestra dei carbonai)

Stilo diritto (ginestra comune)

Altezza: 0,6-1,5 m (ginestra dei carbonai)

Altezza: 2-5 m (ginestra comune)

bilabiato



Pilocarpo (*Pilocarpus* sp.)



***Pilocarpus microphyllus* Stapf**

Pilocarpo o Jaborandi


Rutaceae

Angiosperma-Dicotiledone-Rosidae



Arbusto (fino a 2m)


America Centrale e del Sud



pilocarpo




Foglie composte (da 3 a 15 foglioline), con lungo picciolo e corto piccioletto. IMPARIPENNATE. Margine intero. Lembo **asimmetrico**. Apice **smarginato**. Nervature sporgenti. Nervatura superiore punteggiata da **tasche** contenenti oli essenziali





Le tasche «punteggiano» la foglia







Fiori piccoli, di colore rosso porpora, raggruppati in racemi allungati.




Frutto: follicoli deiscenti contenenti un singolo seme nero e lucido, grande pochi millimetri.



Semi

DROGA: foglie

PRINCIPI ATTIVI: alcaloidi imidazolici (0,5-2%), principalmente **pilocarpina** (0,5-1%) e composti correlati (pilocarpidina, isopilocarpina, jaborina). Presenti anche tannini e **terpeni**.



L'estrazione e il successivo isolamento della pilocarpina devono avvenire **in tempi brevi** in quanto la sua struttura è chimicamente poco stabile nella droga: la conservazione della droga secca per un anno ne comporta una perdita del 50%.

Non si ha commercio della droga grezza, la cui esportazione in alcuni paesi come il Brasile (principale produttore mondiale) è sottoposta a rigide limitazioni. **Quasi il 100% della produzione** viene **indirizzata all'estrazione** a fini farmaceutici.

USI

La pilocarpina ha azioni opposte a quelle dell'atropina

Può essere associata alla fisostigmina (Contrazione pupilla → trattamento del glaucoma)


L'uso in prodotti cosmetici è vietato

Fonti di carboidrati e derivati

- **Zuccheri semplici e derivati** (glucosio, fruttosio, xilitolo, mannitolo)
- **Disaccaridi:** saccarosio
- **Oligosaccaridi:** ciclodestrine
- **Polisaccaridi:** amido, cellulosa, gomme, mucillagini, ficocolloidi







Droga: calice

Principi attivi: mucillagini, vit C, ...

KARKADE'

Classificazione:
Angiosperme
Dicotiledoni
Roside

Foglie lobate, nervature rosse

Fiori ascellari, dialipetali, con calice gamosepalo, con evidente unghia rossa

Fusto rosso

Calice carnoso



Capsula
(semi reniformi)

Descrizione botanica


Pianta erbacea o suffruticosa

L'antèsi dura **solo un giorno**, trascorso il quale i petali appassiscono e il calice inizia a ingrossarsi. Circa **sei mesi dopo**, il frutto completamente maturo risulta avvolto dal calice carnoso, rosso scuro brillante.

Nome scientifico: *Hibiscus sabdariffa* L.

Nome volgare: karkadè o carcadè

Famiglia: Malvaceae





DROGA

Calice, dopo la fecondazione

PRINCIPI ATTIVI

Acido ascorbico, acido citrico,
mucillagini, tannini



PROPRIETA'

Dissetante
Correttore del sapore



Nome scientifico: *Gossypium herbaceum* L., *G. arboreum*

Nome volgare: cotone

Famiglia: Malvaceae

Angiosperma,
Dicotiledone,
Roside

DESCRIZIONE BOTANICA

Erbacea (annua) o arbustiva (il carattere dipende dalla specie).

Fiori ascellari, foglie palmate a margine intero.

Frutto è una capsula con semi provvisti di peluria.

Foglie *alterne*, palmate



COTONE

I fiori, giallo crema, dopo sbocciati, tendono a diventare rossi, con una macchia rossa alla base
Con **calicetto** a 3 pezzi




COTONE



I peli posso essere lunghi anche 4,5 cm



Punto di fumo: 232°C (frittura)



GOSSIPOLO (IL «PILLOLO»)

DROGA

SEME per i tricomi epidermici (ogni seme può avere anche 10000 peli!!!), da cui si ottiene la fibra di cotone. Il seme contiene anche proteine e **lipidi**

PRINCIPI ATTIVI: CELLULOSA (91%), OLIO

USO: garze, bende (cellulosa); olio (cosmesi, alimenti confezionati)




Pianta erbacea **perenne**
Diffusa in **Europa**
Cresce ai margini delle strade o in zone **incolte**.

Fiori **ascellari**

Foglia **palmata**

Picciolo **LUNGO**



Nome scientifico: *Malva sylvestris L.*
Nome comune: Malva
Famiglia: Malvaceae
(Angiosperme-dicotiledone-roside)

Il frutto è un **poliachenio** ha la forma di un disco



Fiore con 5 petali, violacei con venature più scure

Calice con 5 sepali + calicetto (3 bratteole)





POLIACHENIO

Droga: fiori e foglie

Costituenti: mucillagini (8%), malvidina (antocianidina)


Impiego: emolliente, antiinfiammatorio (g.i., bocca), trattamento della stitichezza,





Puccinia malvacearum (ruggine della malva)

Lembo inferiore della foglia



Grande pianta erbacea **perenne**

calicetto (bratteole num. 6-9, saldate alla base)

foglia: foglie palmate (piu lobi), nell'altea quello centrale predomina



Nome scientifico: *Althaea officinalis* L.
Nome comune: Altea
Famiglia: Malvaceae
(Angiosperme-dicotiledone-roside)



POSSIBILE CONFUSIONE DELL'ALTEA CON LA MALVA

ALTEA:

calicetto (bratteole num. 6-9, saldate alla base)

foglia: foglie palmate (piu lobi), il lobo centrale predomina

MALVA:

calicetto (bratteole num. 3, saldate alla base)

foglia: foglie palmate (piu lobi)



Droga: fiori e foglie, ma soprattutto **radice** (raccolte al secondo anno)

Costituenti: mucillagini (25-35 % nelle radici)

Attività: come la malva



**ALTEA
RADICE**

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Versare in un recipiente 200 ml circa di acqua e un cucchiaino di altea prolungando l'ebollizione per pochi istanti. Spegner e lasciare in infusione per 15-20 minuti (mescolando di tanto in tanto), filtrare, dolcificare a piacere.

MODALITA' D'USO
Da 1 a 3 tazze al giorno.

INGREDIENTI
Altea (*Althaea officinalis*) radice.

Salus in Erbis Prodotto nello stabilimento in via
www.salusinerbis.it Lucio Elio Selano 95-97 - Roma

ERBE GARANTITE E CERTIFICATE
Confezionate in atmosfera protettiva

Lotto: 034115 511672

CONSUMARE PREFERIBILMENTE ENTRO IL:
La data indicata è riferita al prodotto integro nella sua confezione originale sigillata. Una volta aperta utilizzare preferibilmente entro 12 mesi.

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO **Peso netto: 100 g**



Nome scientifico: ***Plantago psyllium*** L.

Nome comune: psillio

Famiglia: Plantaginaceae

(Angiosperme-dicotiledone-asteride)

In commercio semi di psillio di specie differenti





macchia più chiara

Il seme ha due facce

10-12 % di mucillagini

Può assorbire acqua fino a 25 volte il suo peso



TIGLIO: alberi diffusi in Europa ed Asia, nelle zone temperate e fredde; le specie principali in Europa sono *Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*, *Tilia tomentosa*



Le foglie del tiglio



Evidente asimmetria in *T. platyphyllos*




Fitta peluria in corrispondenza dell'incrocio delle nervature in *T. cordata*



Tilia tomentosa, coperta da una leggera peluria e con la pagina inferiore di colore grigio argento.








Tilia platyphyllos Scop.

Brattee
 saldate parzialmente al peduncolo dell'infiorescenza, di colore verde-giallastro (fino a 10 cm) pergamenacea

Infiorescenze
 con fiori pentameri con corolla dialipetala e numerosi stami (b)

Frutti
 Noci pubescenti (con peli), con pericarpo molto duro

Foglie
 Con lamina a forma di cuore (foglie cordate)



Tilia cordata Mill.

Tilia cordata Mill.


Famiglia **Tiliaceae** (Angiosperme-Dicotiledoni-Roside)

Droga: infiorescenze e brattee

Costituenti: mucillagini (10%), **flavonoidi** come glicosidi

Attività: sedativo per affezioni respiratorie, favorisce il sonno, **diaforetico** in stati febbrili (**aumenta la sudorazione**)






Foglie
bipennato - composte

Infiorescenze a spiga

Fiori sessili, con **stami preponderanti** (molto più lunghi della corolla) e **petali quasi assenti**.

Spine

Nome scientifico: *Acacia senegal e specie correlate*
Nome comune: Acacia
Famiglia: Leguminosae (Mimosaceae)-Rosidae



Droga: gomma arabica

Impiego: stabilizzanti, gelificanti (industria alimentare, cosmetica e farmaceutica)

Semi piatti

Ha bisogno di luoghi aridi per produrre gomme



Foglie **bipennato**-composte




LAMINARIA

Laminaria sp.
Laminariaceae
Alga bruna, Feoficee



Tallo nastriforme (circa 1m)



Droga: FRONDA

PRINCIPI ATTIVI

Ac. Alginico, iodio

USO


Emulsionante, addensante, ovatta emostatica, regolazione attività della tiroide (iodio)

FUCUS (quercia marina)



Fucus vesiculosus
Fucaceae
Alga bruna, Feoficee

Strutture riproduttive



Ramificazione dicotomica

DROGA

Tallo essiccati (nastriiformi e consistenza cartacea)

PRINCIPI ATTIVI

Fucano, iodio

USO

Ipotiroidismo (iodio)

Saziante (fucano)

aerocisti

pseudonervatura

Palma da dattero



PRODUZIONE DATTERO, bacca monosperma, ricca di zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio)

Le diverse fasi di maturazione del dattero



BACCA MONOSPERMA







Le canne (droga) vengono spremute per ottenere un succo da cui si ottiene lo zucchero da tavola
Saccarosio (anche come eccipiente di medicinali)

Canna da zucchero

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO



**Radice fittonante,
tuberizzata
(DROGA)**

Pianta erbacea **bienne**

Stessa specie della bieta
comune, ma è una varietà
diversa

FRASSINO DA MANNA

Specie di frassino presente in Italia, specialmente in Calabria e Sicilia

Essudato prodotto in seguito a stress (caldo, aridità)

Manna (60% mannitolo)

