


Un organismo vivente si comporta come un sistema termodinamicamente aperto, ovvero, interagisce con l'ambiente scambiando materia ma anche “informazioni”

Stimoli
ambientali
(informazione)



L'accrescimento,
il metabolismo, il
movimento, la
virulenza

{ Modulazione
dell'espressione o
dell'attività delle
proteine }

TRASDUZIONE DEL SEGNALE

Si tratta del processo attraverso il quale un segnale extracellulare (chimico o fisico) determina una risposta intracellulare.

Questa risposta può essere:


- ✓ Una variazione dell'espressione genica**
- ✓ Una modulazione dell'attività di uno o più enzimi**
- ✓ Una modulazione comportamentale del batterio (come la motilità)**

Il meccanismo di trasduzione del segnale meglio conosciuto e studiato è quello detto del sistema a due componenti.

I primo componente è una proteina transmembrana con un dominio NH₂ terminale esposto all'esterno della cellula ed un dominio citoplasmatico.

Questa prima proteina è detta SENSORE



Il secondo componente è una proteina citoplasmatica in grado di esercitare un ruolo regolativo. Questa proteina è detta REGOLATORE



Il segnale, di tipo chimico, viene trasdotto attraverso la membrana, dal sensore e trasformato in un segnale chimico: la fosforilazione

Il segnale, sottoforma di fosforilazione, viene trasferito al regolatore che, modificato strutturalmente esercita il suo ruolo

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL SISTEMA A DUE COMPONENTI




Il dominio trasmettitore ha attività kinasica e fosfatasica. È infatti in grado, quando viene stimolato da un agente esterno specifico, di autofosforilarsi e trasferire il fosfato al ricevitore, oppure di defosforilarsi o defosforilare il ricevitore.

È interessante notare che in questi sistemi si ha sempre il passaggio del fosfato da una ISTIDINA nel dominio del trasmettitore ad un residuo di ASPARTATO posto in una tasca acidica del dominio ricevitore.

Questo passaggio è termodinamicamente favorito dal fatto che l'energia libera contenuta nell'istidina-fosfato è maggiore di quella contenuta nell'aspartato-fosfato

Un esempio classico di sistema a due componenti è quello denominato EnvZ/OmpR. Questo sistema esercita il controllo sull'espressione di due differenti porine in risposta alle condizioni osmotiche.



Le porine sono proteine che formano dei canali che permettono il passaggio di piccole molecole idrofiliche attraverso il rivestimento cellulare.

E. coli ne possiede due tipi che si distinguono per le dimensione del poro e, quindi, per la selettività nella permeabilità.

Le porine di tipo OmpC hanno un canale di 1.08 nm mentre quelle di tipo OmpF ne presentano uno di 1.16 nm

In condizioni di diffente osmolarità, anche se la quantità totale di porine resta invariata, cambia la loro composizione qualitativa

In condizioni di alta osmolarità prevale la forma OmpC (maggiore effetto setaccio), mentre in condizioni di bassa osmolarità prevale la forma OmpF (minore effetto setaccio).

La proteina EnvZ è dotata di attività chinasica e di attività fosfatasica a carico di OmpR.



Queste due attività prevalgono l'una sull'altra in risposta alle condizioni di osmolarità dell'ambiente:

In condizioni di elevata osmolarità (elevata presenza di sali) prevale l'attività chinasica e si ha un aumento di OmpR-fosforilato

In condizioni di bassa osmolarità (bassa presenza di sali) prevale l'attività fosfatasica che riduce OmpR-fosforilato a favore di OmpR


Bassa
osmolarità

Alta
osmolarità



Sistemi a due componenti NON-ORTODOSSI

In questa categoria ricadono numerosi sistemi di trasduzione del segnale che utilizzano il medesimo meccanismo del sistema a due componenti ma che sono caratterizzati da componenti aggiuntivi in particolare una proteina con dominio Hpt.




Il dominio Hpt presenta un residuo di Istimina fosforilabile a partire da un residuo di Aspartato rendendo possibile un aumento degli “salti” del gruppo fosfato

SEGNALE



Istidina
trasmettitore



Aspartato
pseudoricevitore

Istidina
Hpt domain




Aspartato
ricevitore




FUNZIONE




SPORULAZIONE IN *Bacillus subtilis*




TRASDUZIONE DEL SEGNALE PER IL CONTROLLO DELL'ESPRESSIONE DEI GENI DI VIRULENZA DI *Bordetella pertussis*



Sistema di trasduzione del controllo della respirazione aerobica (ArcB/ArcA)




Stimuli



Stimolo




extracellulare



Membrana

citoplasma



Stimoli

