

Dove osservarli




- P.N. Circeo
- T.P. di Castelporziano
- Tenuta di Capocotta
- Castelfusano
- R.N.S. del Litorale romano
- Palo Laziale

Boschi di caducifoglie planiziali e collinari

- Aree di pianura umida
(tipica presenza di pozze)
- Querce caducifoglie
(farnia, cerro, farnetto)
- Habitat molto ridotto e quasi sparito
- Roverella domina a quote maggiori *(più adattabile a siccità e gelate)*





Dove osservarli

- P.N. Circeo
- T.P. di Castelporziano
- Bosco di Foglino
- Aree collinari dell'Alto Lazio (Reatino e Viterbese)

Boschi di caducifoglie montani



- Il Faggio è l'albero dominante (*dai 1.000 ai 1.800 m*)
- Sottobosco assente
- Ambiente 'monotono'
- Bassa biodiversità (*ma con specie molto importanti*)



Dove osservarli

- Faggete montane
 - Monti della Laga
 - Monti Simbruini
 - Monti Lucretili
- Faggete “depresse”
 - Oriolo Romano
 - Soriano del Cimino
 - Monte Venere
 - Allumiere
 - Roccamassima (*M.ti Lepini*)

Praterie e cespuglieti di quota

- Dai 1.850 m in su
- Clima rigido = poche piante basse (*ginepro*, *mirtillo*)
- Spesso ambiente secondario
- Poche specie molto ben adattate

